

Captan 80 WDG

Fongicide

Fongicide organique pour la lutte contre les maladies cryptogamiques en arboriculture.

Produit	Captan 80 WDG est un granulé à disperser dans l'eau (WG) et contient 80% captan. (W-6635)
Cultures	Arboriculture (O)
Spectre d'efficacité	cylindrosporiose du cerisier, pourriture amère des cerises, maladie criblée des Prunus, tavelure des arbres fruitiers à pépins, pourriture lenticellaire (pommier), tavelure tardive des pommes.
Emploi Arboriculture	Cerisier: 0.15% (2.4 kg/ha), contre <i>cylindrosporiose du cerisier</i>, <i>pourriture amère des cerises</i>. Délai d'attente: 3 Semaine(s). Le dosage indiqué s'applique à un volume de haie foliaire de 10'000 m³ par ha. Conformément aux instructions du service d'homologation, le dosage doit être adapté au volume des arbres. Pour protéger les eaux souterraines, ne pas procéder en tout à plus de 10 applications d'un produit contenant du captane par parcelle et par an. Pour protéger les organismes aquatiques des conséquences liées à la dérive, respecter une zone tampon non traitée de 20 m par rapport aux eaux de surface. Cette distance peut être réduite en recourant à des mesures techniques de réduction de la dérive, conformément aux instructions du service d'homologation. Fruits à noyaux: 0.15% (2.4 kg/ha), contre <i>maladie criblée des Prunus</i>. Délai d'attente: 3 Semaine(s). Le dosage indiqué s'applique à un volume de haie foliaire de 10'000 m³ par ha. Conformément aux instructions du service d'homologation, le dosage doit être adapté au volume des arbres. Pour protéger les eaux souterraines, ne pas procéder en tout à plus de 10 applications d'un produit contenant du captane par parcelle et par an. Pour protéger les organismes aquatiques des conséquences liées à la dérive, respecter une zone tampon non traitée de 20 m par rapport aux eaux de surface. Cette distance peut être réduite en recourant à des mesures techniques de réduction de la dérive, conformément aux instructions du service d'homologation.

	Poirier / Nashi, Pommier : 0.15% (2.4 kg/ha), contre <i>tavelure des arbres fruitiers à pépins</i>. Délai d'attente: 3 Semaine(s). Le dosage indiqué s'applique à un volume de haie foliaire de 10'000 m³ par ha. Conformément aux instructions du service d'homologation, le dosage doit être adapté au volume des arbres. Pour protéger les eaux souterraines, ne pas procéder en tout à plus de 10 applications d'un produit contenant du captane par parcelle et par an. Pour protéger les organismes aquatiques des conséquences liées à la dérive, respecter une zone tampon non traitée de 20 m par rapport aux eaux de surface. Cette distance peut être réduite en recourant à des mesures techniques de réduction de la dérive, conformément aux instructions du service d'homologation. Pommier : 0.15% (2.4 kg/ha), contre <i>pourriture lenticellaire (pommier)</i>, <i>tavelure tardive des pommes</i>. Délai d'attente: 3 Semaine(s). Le dosage indiqué s'applique à un volume de haie foliaire de 10'000 m³ par ha. Conformément aux instructions du service d'homologation, le dosage doit être adapté au volume des arbres. Pour protéger les eaux souterraines, ne pas procéder en tout à plus de 10 applications d'un produit contenant du captane par parcelle et par an. Pour protéger les organismes aquatiques des conséquences liées à la dérive, respecter une zone tampon non traitée de 20 m par rapport aux eaux de surface. Cette distance peut être réduite en recourant à des mesures techniques de réduction de la dérive, conformément aux instructions du service d'homologation.
Mode d'action	Captan est un fongicide de contact et doit être appliqué préventivement. Il empêche la germination des spores et l'accroissement du mycélium. Captan bloque la respiration et provoque ainsi le dépérissement des cellules.
Préparation de la bouillie	Préparation de la bouillie: verser le produit directement au travers du tamis dans le réservoir rempli à moitié d'eau. Ensuite compléter le réservoir selon besoin. Agiter constamment la bouillie. Mélanges: Captan 80 WDG est miscible avec nos fongicides et insecticides. Protection des utilisateurs: Préparation de la bouillie: Porter des gants de protection + une tenue de protection + des lunettes de protection ou une visière. Application de la bouillie: Porter des gants de protection + une tenue de protection. Les équipements techniques utilisés lors de l'application (p. ex. cabine de tracteur fermée) peuvent remplacer les équipements personnels de protection s'ils offrent de manière avérée une protection semblable ou supérieure. Travaux successifs: porter des gants de

	protection + une tenue de protection jusqu'à 48 heures après l'application du produit.
Rotation des cultures	Pas de restriction.
Classement	Attention  P102 Tenir hors de portée des enfants. EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H351 Susceptible de provoquer le cancer. H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
Comportement dans l'environnement	Le produit est homologué par l' OSAV. On peut l'utiliser en PER, les restrictions de certains programmes sont à observer.
Emballage	1 kg, 5 kg, 20 kg.
®	
A Observer	Cette fiche vous informe et ne remplace pas l'étiquette. Avant d'utiliser un produit, veuillez lire attentivement l'étiquette et s'y tenir conformément.

Version 01.04.22/RH/PM/LG0000